



Gilles Martin

CHEF DE RUBRIQUE
PHOTOGRAPHE PRO NATURE
www.arche-photographique.org
www.gilles-martin.com

« L'Arche photographique »

Dans chaque numéro d'Image & Nature, retrouvez le carnet de route de Gilles Martin qui vous raconte ses récents voyages et les dernières avancées de son grand projet: « L'Arche photographique ».

Fiche d'identité du grèbe castagneux:

- **Tachybaptus ruficollis.**
- **Classe:** Oiseau.
- **Ordre:** Podicipédiformes.
- **Familles:** Podicipédidés.
- **Description:** le plus petit des grèbes (taille: 23 à 29 cm et poids: 100 à 200 g). Cou court, corps rondlet et arrière duveté, petit bec étroit. Plumage nuptial: dessus brun foncé, dessous roux, avec joue et gorge marron, tâche jaune verdâtre. En hiver: plumage beaucoup plus pâle, brun et beige avec gorge blanche, cou et flancs pâles, arrière blanchâtre.



© Gilles Martin

Espèce commune en France, nicheuse et sédentaire, le grèbe castagneux bénéficie depuis deux ans d'un statut de protection. Complétés par des hivernants venus du Nord, ses effectifs semblent stables bien qu'ils soient menacés par l'assèchement de leurs milieux.

Le grèbe castagneux

La saison de nidification du grèbe castagneux a déjà bien commencé. Réunis parfois dès la fin mars, certains couples sont en pleine période de couvain (quatre à six œufs entre avril et juillet). En ce mois de mai, il n'est même pas rare de voir les premiers petits barboter aux côtés de leurs parents. Et avec quelle aisance, cela m'impressionne toujours! Quelques minutes après l'éclosion, je les ai vus sauter à l'eau et se déplacer comme des bouchons; mais cela n'a pourtant rien d'étonnant puisque les poussins sont nidifuges. C'est un avantage face aux prédateurs comme le busard des roseaux. Très rapidement, les jeunes mènent donc leur petite vie à côté de leurs parents, tantôt à la nage, tantôt sur leur dos. Le couple s'occupe de les nourrir car ils ne deviendront autonomes qu'au



© Gilles Martin

bout d'un mois et demi. Une seconde ponte ou une ponte de remplacement n'est pas rare et peut s'effectuer jusqu'au mois d'août.

Petit mais costaud

Le grèbe castagneux est le plus petit des grèbes, des oiseaux aquatiques, plongeurs


et pêcheurs. Cette famille des podicipédidés comporte neuf espèces, dont cinq sont présentes en France: le grèbe huppé, le grèbe à cou noir, le grèbe castagneux, le grèbe esclavon et le grèbe jougris. Le grèbe à bec bigarré est une espèce américaine, très occasionnelle en Europe.

Photographier les grèbes castagneux


Cette série de photos a été réalisée sur trois années d'affût flottant. Je pense que c'est la meilleure méthode pour réaliser des clichés de cet oiseau relativement petit et farouche. On peut ainsi rechercher plus facilement un nid, puis suivre les oiseaux sur l'eau. De toute façon, le grèbe castagneux évolue dans des eaux peu profondes au bord des rives (vous aurez donc tout le temps pied). Dans

ces conditions d'affût, je vous conseille de travailler au 300 mm (même si le 500 mm est aussi utilisable) car cela permet d'avoir un angle assez large et de toujours garder l'oiseau dans le viseur. Comme il faut pouvoir se déplacer rapidement dans l'eau, je préconise un affût flottant léger. Côté réglages, je travaille en autofocus continu (AI servo chez Canon et AF-C chez Nikon). Par chance, cet

oiseau s'habitue rapidement à l'affût flottant et au bout de quelques jours, vous pourrez l'approcher et ainsi réaliser des photos en « pleine pastille ».



© Gilles Martin



© Gilles Martin

Le petit et trapu castagneux mesure entre 23 et 29 cm à peine. Il est immédiatement identifiable à sa tête ronde, son petit bec mince aux commissures pâles et à son arrière tronqué et duveteux. Les adultes sont semblables: en plumage nuptial, la tête est noire, tandis que le menton, la joue, la gorge et les côtés du cou sont marron (brun roux). Le reste du plumage est brun sombre, mêlé de fauve sur les côtés du croupion et marbré de blanc sur le ventre. En hiver, l'oiseau est moins coloré. La gorge, l'avant du cou

et les flancs sont chamois fauve tandis que la calotte, la nuque et les parties supérieures sont brunes.

Le grèbe castagneux est un oiseau très discret voire farouche, qui apprécie les étangs et les mares à végétation fournie (il construit son nid avec des roseaux et des branchages fins). Il se nourrit essentiellement d'insectes aquatiques (libellules, éphémères...) ou non (mouches...) et de larves, parfois même de petits batraciens, de têtards, etc.

Son chant ressemble à un long hennissement, il s'agit d'un trille aigu descendant sur la fin. On l'entend surtout en période de nidification.

Un oiseau commun

Considéré comme nicheur et hivernant commun en France continentale et en Corse dans les années 50, selon *Le nouvel inventaire des oiseaux de France*, le grèbe castagneux n'a jamais bénéficié d'un recensement exhaustif depuis – certainement à cause de sa discrétion, son caractère farouche et des tech-

niques de comptages pas toujours fiables. Néanmoins, l'UICN estime sa population entre 470000 et 2,6 millions d'individus (classé en LC, préoccupation mineure, sur la Liste rouge des espèces menacées). En France, le grèbe castagneux est protégé depuis la fin 2009. Ses effectifs nicheurs sont stables, environ 2500 à 3000 couples, a priori sédentaires, avec une moyenne de 6500 hivernants.

Outre la pression humaine à laquelle il est très sensible, le grèbe castagneux peut bien sûr être affecté par la pollution des eaux via son alimentation, mais il est principalement menacé par l'assèchement des marais, le bétonnage des rives, le curage excessif des rivières, qui limitent ses sites de nidification. Cependant, cette espèce s'est bien adaptée aux milieux artificiels, y compris urbains (anciennes gravières, parcs, bassins de retenue, etc.) pourvu qu'un minimum de végétation aquatique se développe sur les bords. ■

La petite châtaigne

Du bouchon à la châtaigne

Si les petits du grèbe castagneux, nidifuges, ressemblent étrangement à des petits bouchons dès qu'ils nagent dans l'eau, c'est surtout son aspect « boule de duvet » dû à son derrière arrondi et souvent ébouriffé, qui lui donne une allure de bouchon qui flotte sur l'eau. Le mot castagneux est un dérivé de *castanea*, châtaigne en latin, et serait une référence à la couleur châtain des joues et de la gorge de l'oiseau en plumage nuptial, ou à la forme très ronde de son corps.

Répartition

Selon *Le nouvel inventaire des oiseaux de France*, c'est en Rhône-Alpes que l'on dénombrait, il y a une dizaine d'années, le plus



© Gilles Martin

grand nombre de couples (2500 à 3000 dont 800 à 1000 rien qu'en Dombes). Le Poitou-Charentes et le Centre, ainsi que l'Auvergne possédaient également de bons effectifs (entre 500 et 1000 couples). Ce même ouvrage de référence fait état d'une population estimée à 8000/10000 couples au début des années 2000. Birdlife International estime sa population européenne à plus de 100000 couples et sa population mondiale entre 610000 et 3,5 millions.

Confusion

En période hivernale, la confusion est toujours possible avec le grèbe à cou noir et, dans une certaine mesure, avec l'esclavon.