


LE LYCAON



CARACTÉRISTIQUES

<i>Règne</i>	Animal
<i>Embranchement</i>	Cordé
<i>Classe</i>	Mammifère
<i>Ordre</i>	Carnivore
<i>Famille</i>	Canidé
<i>Genre</i>	Lycaon
<i>Nom latin</i>	Lycaon pictus
<i>Poids</i>	18 à 40 kg
<i>Longueur</i>	90 à 150 cm
<i>Taille au garrot</i>	60 à 80 cm
<i>Maturité sexuelle</i>	12 à 18 mois
<i>Saison de reproduction</i>	Novembre
<i>Gestation</i>	70 jours
<i>Nombre de jeunes</i>	2 à 10
<i>Intervalle entre reproductions</i>	1 an
<i>Régime alimentaire</i>	Carnivore
<i>Longévité</i>	11 ans
<i>Statut UICN</i>	En voie de disparition


Savez-vous que le lycaon est le seul canidé ne possédant que 4 doigts à chaque patte ? Les autres canidés en possèdent 5. Autre originalité : constitué de brun, noir, jaune et blanc, son pelage varie selon les individus, il s'agirait peut-être d'un moyen pour se reconnaître entre « loups peints ». Leurs grandes oreilles rondes sont garnies de poils qui empêchent les insectes d'y pénétrer. Ces nomades des savanes d'Afrique de l'Est et australe vivent en meute de 5 à 50 individus. Ils parcourent un territoire dépassant parfois 2500 km². L'organisation sociale dominée par un



Marquage du territoire.

Lycaon *Lycaon pictus.*

couple fonctionne à merveille et cette harmonie est rarement troublée par les bagarres. Contrairement au lion, les jeunes lycaons s'alimentent les premiers après la chasse. Les individus âgés ou blessés ne sont pas exclus. Le reste du groupe les nourrit de morceaux de viande régurgitée. La cohésion du groupe fait sa force lors des chasses parfaitement orchestrées en silence. Malgré leur relative petite taille, les lycaons sont de formidables prédateurs. Ils choisissent généralement des proies jeunes ou malades qu'ils sont capables de poursuivre sur 5 km à 60 km/h. Mais une meute importante peut



venir à bout d'un lion sans problème. Au menu : gazelles de Thomson, impalas, antilopes... Un adulte consomme 3 kg de viande par jour. Les jeunes commencent à en manger dès le deuxième mois, sous forme de morceaux régurgités par les aînés. En général, seule la femelle du couple

dominant donne naissance à des petits : entre 2 et 10 par portée, une fois par an. À cette occasion, la troupe se sédentarise et vit dans un même terrier. Les trois premières semaines, les petits ne quittent pas la tanière. Ils sont allaités pendant un mois et particulièrement choyés par l'ensemble du clan. Au bout de trois mois, la meute reprend ses déplacements.

Encore récemment considéré comme un animal cruel et nuisible, il a été exterminé de tout temps par l'homme.

Des 100 000 individus recensés en Afrique sub-saharienne au début du XX^e siècle, il en reste moins de 3 000 aujourd'hui. Le lycaon est classé comme espèce en voie de disparition depuis 1990 par l'UICN. Devant le recul de son espace naturel, il entre en concurrence de plus en plus féroce avec d'autres carnivores, tels que le lion et la hyène. La multiplication des clôtures fragmente son territoire, entraînant la scission des meutes et




Il ne reste plus aujourd'hui que 3 000 lycaons.


l'isolement des groupes. Ce qui ne va pas sans poser de graves problèmes de consanguinité. Les lycaons sont aussi victimes des voitures et de l'élargissement du réseau routier.

*Lycaon équipé
d'un collier
émetteur pour le
Radio-tracking.*





Comportement d'intimidation du lycaon.



Le lycaon, très menacé, est classé espèce en voie de disparition par l'UICN.

Sensibles aux maladies, ils ont été contaminés et décimés par le virus de Carré, issu des chiens domestiques et propagé par les chacals et les hyènes. Aujourd'hui, ils survivent essentiellement dans des réserves. Le taux de mortalité des jeunes est très élevé, ce qui rend sa réintroduction dans son environnement naturel difficile.

Texte de **Laurent Tenard** - Photographies de **Gilles Martin**